

МІСЯЦЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРО
РАК ШИЙКИ МАТКИ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТРИ
КОНТРОЛЮ
ПРОФІЛАК
ХВОРОБ

**Сімейні лікарі відіграють
важливу роль у ранньому
виявленні безсимптомного
раку.**



Сімейні лікарі також мають сприяти виконанню всіх рекомендацій спеціалістів щодо протипухлинного лікування.

Лікарі первинної ланки мають надавати інформацію щодо профілактики раку шийки матки:

- * Рекомендації щодо уникнення впливу факторів ризику розвитку РШМ, пов'язаних зі способом життя.
- * Рекомендації щодо вакцинації проти ВПЛ.
- * Інформування пацієнок віком від 18 років (або з початком статевого життя) до 60 років про важливість і необхідність проходження обов'язкового профілактичного гінекологічного огляду не рідше 1 разу на рік та цитологічного скринінгу на РШМ не рідше 1 разу на 3 роки.
- * Інформування про своєчасну діагностику та лікування передракових станів шийки матки.
- * Інформування пацієнок про результати цитологічного обстеження.
- * Направлення пацієнок з патологічними мазками на подальше обстеження і лікування.

Вторинна профілактика раку передбачає своєчасне виявлення передпухлинних станів і захворювань, їх лікування та ретельний диспансерний нагляд за хворими. Одним з методів вторинної профілактики раку є активний скринінг раку та передракових станів.

Більше інформації на сайті ЦГЗ: <https://bit.ly/3TlzQUZ>