

МІСЯЦЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРО
РАК ШИЙКИ МАТКИ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ
ПРОФИЛАКТИКИ
ХВОРОБ

70%

**Близько
випадків раку
шийки матки асоціюють
з інфікуванням вірусом
папіломи людини (ВПЛ)
16 та 18 типів**

Більшість випадків раку шийки матки пов'язані з вірусом папіломи людини (ВПЛ), який передається статевим шляхом. Щеплення проти вірусу папіломи людини може зменшити ризик розвитку раку шийки матки.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом. Є понад 80 типів папіломавірусу людини, приблизно 30 із них можуть уражати шийку матки та вважаються онкогенними. ВПЛ 16 та 18 типів найчастіше пов'язують із раком шийки матки. Близько 70% випадків РШМ асоціюють з інфікуванням цими типами ВПЛ. Імунна система організму може боротися з інфікуванням вірусу, проте у певної кількості жінок, інфікованих ВПЛ, розвивається РШМ.

Які фактори підвищують рівень інфікування ВПЛ?

* Ослаблена імунна система.

* Сексуальна активність у молодому віці або багато сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передавання вірусу секс із проникненням є не обов'язковим. Шляхом передавання інфекції також може бути тілесний генітальний контакт.

Щеплення проти ВПЛ може зменшити ризик розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Вакцинацію від ВПЛ проводять у багатьох країнах світу. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до переліку «рекомендованих». Вакцинація проти ВПЛ може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов'язаних із вірусом.

МІСЯЦЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРО
РАК ШИЙКИ МАТКИ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ
ПРОФИЛІ
ХВОРО

Які фактори підвищують ризик інфікування ВПЛ?

- Ослаблена імунна система
- Сексуальна активність у молодому віці або багато сексуальних партнерів

Для передавання ВПЛ секс із проникненням є не обов'язковим. Інфекція може передаватись шляхом тілесного генітального контакту.

Більше інформації на сайті ЦГЗ: <https://bit.ly/3TizQUZ>