



Від початку року на території області зареєстровано випадок захворювання на лептоспірозд із летальним наслідком. Захворів чоловік віком 59 років, житель Уманського району. Хворий був госпіталізований в інфекційне відділення КНП «Уманська центральна районна лікарня». Діагноз підтверджено лабораторно.

Фахівцями Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено

епідеміологічне розслідування із лабораторними методами досліджень з метою встановлення джерела інфекції та шляхів її передачі. За результатами епідрозслідування в осередку захворювання виявлено сліди життєдіяльності мишоподібних гризунів у підсобних приміщеннях, де було встановлено млин і хворий подрібнював зерно.

У Черкаській області щороку реєструється від 4 до 13 випадків лептоспірозу, на жаль, один-два – закінчуються летально.

У 2023 році зареєстровано 9 випадків захворювання з одним летальним наслідком.

Нагадуємо, що джерелом лептоспірозної інфекції є мишоподібні гризуни, що заселяють, особливо з настанням холодів, об'єкти народного господарства та приватного сектору. Слід зазначити, що на лептоспіroz можна захворіти також внаслідок догляду за хворими на цю інфекцію тваринами – велика рогата худоба, свині, собаки, коти.

Зараження відбувається при вживанні інфікованої води, фруктів, овочів чи продуктів, забруднених виділеннями гризунів, а також при недотриманні правил особистої гігієни вдома і на виробництві. Збудники лептоспірозу виділяються із сечею гризунів і завдяки високій рухливості та проникливості потрапляють в організм людини через пошкоджену шкіру, слизові оболонки та шлунково-кишковий тракт. У воді відкритих водоймищ збудники лептоспірозу зберігають свою життєздатність залежно від умов протягом 30 днів і більше, у вологому ґрунті – до 3-х місяців.

Симптоми лептоспірозу схожі на прояви інших захворювань — наприклад, можуть нагадувати грип чи COVID-19.

Серед симптомів лептоспірозу:

- висока температура;

• головний біль;

• озноб;

• біль у м'язах;

• блювання та діарея;

• жовтяниця;

• почервоніння очей;

• висипання.

Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Хвороба зазвичай починається різко з лихоманки та інших симптомів. Лептоспіроз може перетікати з першої фази з вищезазначеними симптомами до другої — більш важкої — яка може призвести до ураження нирок, печінки або менінгіту. У разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу недуга може призвести до смерті.

Щоб не захворіти на лептоспіроз, фахівці ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендують:

— захищати помешкання, продуктові склади, комори та інші об'єкти від проникнення гризунів;

- уникати контактів із хворими та інфікованими тваринами;
- знищувати гризунів у особистих помешканнях;
- не вживати в їжу м'ясо і молоко хворих на лептоспіroz тварин;
- при вживанні харчових продуктів, що зберігаються в коморах та сховищах, ретельно промивати їх проточною водою;
- обов'язково вакцинувати домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу.

Якщо у вас виникли симптоми захворювання – негайно зверніться до лікаря! Несвоєчасне звернення може коштувати вам життя!