



Туберкульоз залишається найактуальнішою проблемою охорони здоров'я і входить до 10-ти найбільш смертельних хвороб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1993 року туберкульоз є глобальною загрозою для здоров'я всього світу.

В Україні у 1995 році була проголошена епідемія туберкульозу. Зараз Україна належить до групи країн з високим рівнем захворюваності на цю недугу. Другий рік повномасштабної війни ще більш ускладнює ситуацію з цим небезпечним захворюванням.

В умовах епідемії відбувається високе інфікування дітей. Смерть дітей в більшості випадків обумовлена розвитком туберкульозного менінгіту та дисемінованою формою захворювання.

Коли вводиться вакцина БЦЖ

Фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують: одним з основних та найважливіших засобів профілактики та боротьби з туберкульозом є вакцинація БЦЖ. В Україні щеплення проти туберкульозу є обов'язковим і входить до Календаря профілактичних щеплень. Одне з перших щеплень, яке дитина отримує після свого народження – це БЦЖ. Вакцинація проводиться в пологовому будинку на 3-5 добу після народження дитини, але не раніше 48 годин. Щеплення БЦЖ щойно народжених дітей з низькою масою тіла проводиться після досягнення дитиною маси тіла 2000 г.

Якщо дитина не отримала щеплення в пологовому стаціонарі, необхідно обов'язково вакцинуватися в закладі охорони здоров'я за місцем проживання або за місцем укладання декларації. Якщо дитині ще не виповнилося 2 місяці, вакцинація проводиться без попередньої проби Манту. Після 2 місяців проба Манту є обов'язковою. Щеплення БЦЖ проводиться при негативному результаті проби Манту. Вакцинація БЦЖ в Україні є безкоштовною.

Яка реакція можлива на щеплення БЦЖ

Вакцина БЦЖ вводиться внутрішньошкірно. В Україні щеплюватися вакциною БЦЖ в один день з іншими вакцинами – заборонено.

У разі правильної техніки введення в місті ін'єкції в нормі розвивається специфічна реакція у вигляді інфільтрату діаметром до 10 мм із невеликим вузликом у центрі та утворення кірочки. Дуже рідко в центрі інфільтрату з'являється невелике вогнище некрозу. Поствакцинальні реакції з'являються на 4-6 тижні. Зворотній розвиток відбувається протягом 2-4 місяців, після чого в 90-95% щеплених утворюється поверхневий рубчик діаметром 3-10 мм. Такі реакції вважаються нормальними і не

потребують лікування.

Серйозні побічні ефекти після щеплення БЦЖ зустрічаються вкрай рідко та розвиваються у дітей з ослабленим імунітетом. Вакцинація вважається якісною та ефективною, якщо утворюється рубчик 4 мм. і більше, неякісною – 3 мм. і менше. Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.

Два роки життя в умовах війни, активні бойові атаки ворога на медичну систему і цивільне населення, потужна міграція населення як всередині країни, так і з-за кордону підвищують ризик розвитку туберкульозу серед всіх контингентів, особливо серед дітей. Тож захистіть свою дитину від туберкульозу – зробіть щеплення БЦЖ вчасно!