

В області у вересні та жовтні поточного року у м. Сміла та двох населених пунктах Уманського району зареєстровано 3 випадки захворювання на лептоспіроз з летальним наслідком. Захворювання між собою не пов'язані. Хворі при появі симптомів пізно звернулися за медичною допомогою. Зараження на лептоспіроз у двох випадках ймовірно пов'язано з рибною ловлею в Уманському районі у непроточних місцевих ставках, прибережна зона яких заросла очеретом та заселена гризунами. Під час риболовлі мало місце травмування кінцівок рук.

У місті Сміла хворий рубав дрова в приватних домоволодіннях де спостерігалась наявність гризунів.

Нагадуємо, що захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосі на зволожених територіях, при догляді за хворими і інфікованими тваринами, домоволодіннях з наявністю гризунів.

Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Лептоспіроз буває складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань — наприклад, можуть нагадувати грип чи COVID-19.

Серед симптомів лептоспірозу:

- висока температура;
- головний біль;
- озноб;
- біль у м'язах;

- блювання та діарея;
- жовтяниця;
- почервоніння очей;
- висипання.

Людина може захворіти в період від двох днів до трьох тижнів після зараження. Хвороба зазвичай починається різко з лихоманки та інших симптомів. Лептоспіроз може переходити з першої фази з вищезазначеними симптомами до другої — більш важкої — яка призводить до ураження нирок, печінки або менінгіту. У разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу недуга може призвести до смерті.

Щоб уникнути лептоспірозу:

- уникайте потенційно заражених водойм та риболовлі в них;
- вакцинують домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;
- уникайте контактів із хворими та інфікованими тваринами;
- знищуйте гризунів у особистих помешканнях.

Якщо у вас є симптоми захворювання, і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою — зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше, адже захворювання швидко прогресує. Несвоєчасне звернення до лікаря може коштувати життя.