За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зареєстрували та підтвердили випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовлялись від щеплень, передбачених Календарем щеплень, через релігійні переконання.

Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок.

У Рівненської області вже працює команда епідеміологів та вірусологів, які здійснюють першочергові заходи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи, тощо.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.


Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років. Специфічного лікування від поліомієліту не існує, тому пацієнти з таким діагнозом залишаються каліками або помирають. Оскільки функція кінцівок не відновлюється, параліч супроводжує людину довічно.

Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби – це вакцинація. Згідно Календаря щеплень вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.

- 1 доза — 2 місяць життя дитини;
- 2 доза — 4 місяць;
- 3 доза — 6 місяць;
- 4 доза — 18 місяць;
- 5 доза — 6 років;
- 6 доза — 14 років;

Згідно рекомендацій МОЗ України перші два щеплення від поліомієліту потрібно проводити інактивованою (вбитою) вакциною, наступні – живою оральною. Всі вакцини в державі високоефективні, якісні і дозволені до використання.

На сьогодні в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (діти до 1 року, Поліо-3) є недостатнім. За 8 місяців 2021 року – 53,0 %. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95 % не вдасться. Наразі в Черкаській області проти поліомієліту діти до 1 року щеплені на 61,2%.


Показники охоплення щепленням Поліо-3 (до 1 року) в Черкаській області за 8 міс. 2021
Буцький СЦНПМСД
"ЦПМСД" Смілянської МР 82,4
К.-Шевченківський ЦПМСД 73,8
Мехедівська АЗПСМ 71,4
Золотоніський РЦПМСД (Гельмязів) 71,3
Городищенський ЦПМСД 71,1
Лисянський ЦПМСД 70,3
Монастирищенський ЦПМСД 68,5
м. Черкаси 68,2
ЦПМСД Кам'янської МР 67,4
Чорнобаївський ЦПМСД 66,7
ЦПМСД Жашківської МР 64,2
Тальнівський ЦПМСД 62,8
Канівський ЦПМСД 62,2
ЦПМСД Білозірської СР 61,9
ОБЛАСТЬ 61,2
Звенигородський ЦПМСД 61
Черкаський РЦПМСД 60,7
ЦПМСД Христинівської МР 60,7
Єрківська амб. ЗПСМ 60
м. Умань 57,4
ЦПМСД м. Ватутіне 55,6
Катеринопільський ЦПМСД 50
Золотоніський міс.ЦПМСД (СМ) 49,3
Шполянський ЦПМСД 49
Маньківський ЦПМСД 48,1
Чигиринський ЦПМСД 45,9
"ЦПМСД" Тернівської СР 45,8
Драбівський ЦПМСД 43,4
ЦПМСД Паланської СР 39,4
ЦПМСД Мокрокалигірської СР 38,5
ФОП Купченко 34,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90