

Правець – інфекційне захворювання з високими ризиками летальності. У світі щорічно від правця помирає понад 160 тисяч осіб. Для профілактики захворювань на правець використовуються наступні вакцини

- АКДП- вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії і правця. Комбінована вакцина застосовується для планових щеплень дітей у віці 2,4,6,18 місяців за Календарем.

- АДП- вакцина для профілактики дифтерії і правця. Комбінована вакцина застосовується для щеплень дітей за Календарем у віці 6 років.

- АДП-м – вакцина для профілактики дифтерії і правця зі зменшеним вмістом антигену застосовується дітям планово у віці 16 років, а надалі кожні 10 років.

Дитина, яка має повний курс щеплень захищена від правця. Якщо з якихось причин дитина не отримала щеплення у віці до 6 років 11 місяців 29 днів їй призначається індивідуальний курс, який передбачає три щеплення АКДП з інтервалом після кожного в місяць і ревакцинацією через 6 місяців. Діти старше 7 років, які не мають щеплень від правця щеплюються вакциною АДП-м триразово з інтервалом в між 1 і 2 щепленням місяць і 6 місяців між 2 і 3 щепленням. Якщо дитина пропустила одне із обов'язкових щеплень не потрібно розпочинати курс спочатку, незалежно скільки часу минуло від останньої ін'єкції. Необхідно надолужити ті ін'єкції, яких не вистачає з дотриманням мінімальних інтервалів.

Всі вищезазначені вакцини інактивовані, тому вони можуть бути рекомендовані практично всім особам.

Правець – це інфекція, яка пов'язана з порушенням цілісності шкірного покриву, або слизових оболонок, забруднених ґрунтом. Під час бойових дій ризики отримання інфікованого поранення і травм зростають. Для надання протиправцевої допомоги проводять первинну хірургічну обробку рани та екстрену профілактику правця імунобіологічними препаратами. Для екстреної профілактики використовують: АП (анатоксин протиправцевий), ППС (протиправцеву сироватку), ППЛІ (протиправцевий

людський імуноглобулін). Всі препарати вводяться травмованим за певною схемою в залежності від імунологічного статусу постраждалого. В разі відсутності АП, ППС, ППЛІ рекомендовано застосовувати вакцини в склад яких входить протиправцевий анатоксин (АДП та АДП-м). Враховуючи довготривалий інкубаційний період правця екстрену імунопрофілактику необхідно застосовувати в період до 20 днів з моменту отримання травми.