

- «**Омікрон**» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта».

- Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

- Відбувається зсув захворюваності на штам «**Омікрон**» у більш молоді вікові групи. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на

«**Омікрон**»

– 30,8 роки.

- Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «**Омікрону**» – у понад 5 разів вище, 13%.

- Попередньо, «**Омікрон**» у 2,9 рази більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою».

- У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

- Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «**Омікрон**»

. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

- Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «**Омікрон**» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

- Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «**Омікрону**» є в половину меншим, ніж для «Дельти».

- Лише в 0,6% хворих на «**Омікрон**» були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти **COVID-19** як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.

