

За інформацією розміщеною на сайті [суспільне новини](#) ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на території Чортківського району Тернопільської області зареєстровано випадок дифтерії у 29 річної особи, яка приїхала зі східного регіону України. Встановлено, що жінка хворіла 2 тижні і самостійно звернулась за медичною допомогою. Вона мала понад 70 контактів. На даний момент стан пацієнтки стабілізований, вона проходить лікування. В осередку проведені всі протиепідемічні заходи. На разі контактні особи отримують антибіотикотерапію та щеплення від дифтерії за епідеміологічними показаннями.

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається від хворого або бацилоносія повітряно-крапельним шляхом. Зрідка факторами передачі слугують забруднені руки, білизна, побутові речі. Сприйнятливість до дифтерії висока. Розповсюдженню інфекції сприяють порушення санітарно-епідеміологічного благополуччя, війни, недостатні обсяги охоплення щепленнями дітей і дорослих. Дифтерія належить до вакцин керованих інфекцій, тому надійним засобом профілактики є вакцинація. Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету, наявність якого майже ліквідовує ризик розвитку тяжких токсичних форм захворювання. Високий рівень охоплення щепленнями (85 % і більше) усіх вікових груп населення забезпечує зниження захворюваності до поодиноких випадків. Завдяки плановій імунізації дітей дошкільного віку найчастіше дифтерією хворіють дорослі і діти старшого віку, не щеплені, або щеплені з порушенням Календаря. Перенесене захворювання не залишає імунітету, тому можливе повторне інфікування.

Для щеплень дорослого населення використовується вакцина для профілактики дифтерії і правця зі зменшеним вмістом антигенів (**АДП-м**). При відсутності щеплень дорослі повинні отримати первинний вакцинальний комплекс, який складається з трьох ін'єкцій з інтервалом 30-45 днів між першим і другим щепленням і через 6-12 місяців після другої ін'єкції. Надалі ревакцинація проводиться кожні 10 років одноразово. Якщо людина з якихось причин пропустила ревакцинацію, необхідно надолужити як можна скоріше пропущене щеплення, а не розпочинати серію спочатку.

Згідно електронно- звітної форми «**УкрВак**» за **перший квартал 2022 року** стан охоплення дорослого населення в Черкаській області становить

9,2%

від запланованих

80 644

осіб, що є недостатнім і становить загрозу виникнення небезпечної інфекції.