

Чи можна вакцинуватися при варикозі? Чи рекомендують щеплення лікарі при прийомі протитуберкульозних препаратів? Кому рекомендована додаткова доза вакцини від COVID-19?

Спільно з проектом [INSCIENCE](#) відповідаємо на найчастіші запитання щодо вакцинації.

Не вагайтеся та не ризикуйте здоров'ям - вакцинуються і захистіть себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті! <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

**Я ЩЕПЛЕНИЙ ВІД COVID-19
ДВОМА ДОЗАМИ ТА МАВ
КОНТАКТ ІЗ ХВОРОЮ.
ЧИ ПОТРІБНА МЕНІ
САМОІЗОЛЯЦІЯ?**

**КЛУБ
АМБАСАДОРІВ
ТУРБОТИ ПРО
ЗДОРОВ'Я
60+**

Щеплена людина може захворіти і заразити інших, хоч і з меншою імовірністю, ніж нещеплена. Тому, якщо ви турбуєтеся про власну безпеку і безпеку оточуючих, самоізоляція потрібна. Є альтернатива – здати ПЛР-тест.

Вакцинація від COVID-19

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

ЦЕНТР
ГРИПАПОДОБНОГО
ЗДОРОВ'Я

Національна служба
здоров'я України

INSCIENCE

АКАДЕМІЯ
МЕДИЦИНИ
І ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ

ПРІСМУЄМО
РАЗОМ

КОМУ ПОТРІБНА ДОДАТКОВА ДОЗА ВАКЦИНИ ВІД COVID-19?

КЛУБ
АМБАСАДОРІВ
ТУРБОТИ ПРО
ЗДОРОВ'Я
60+

Люди з раком крові, ВІЛ, після хімієтерапії, трансплантації органів, гормональної терапії, у яких міг не сформуватися імунний захист після 2 доз вакцини проти COVID-19, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28-90 днів після другої.



ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ПРИЙОМІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ?

КЛУБ
АМБАСАДОРІВ
ТУРБОТИ ПРО
ЗДОРОВ'Я
60+

Так. Туберкульоз може дати серйозні ускладнення при зараженні людини коронавірусом. Протитуберкульозне лікування не впливає на необхідність вакцинації.



ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕННІ ВЕН?

КЛУБ
АМБАСАДОРІВ
ТУРБОТИ ПРО
ЗДОРОВ'Я
60+

Можна. Будь-якою вакциною із наявних в Україні. Як і інші серцево-судинні хвороби, варикозне розширення вен є показанням до вакцинації, адже може серйозно ускладнити перебіг COVID-19.

